

## LOTTA ALLA VARROA MEDIANTE INGABBIAMENTO DELLA REGINA.

---

- contributo di [Marco Bianchi](#)

Questa metodologia è stata applicata a partire dalla metà di luglio 2011 su circa 250 famiglie di queste circa 30 erano nuclei.

Le famiglie erano dislocate un centinaio nell'olgiatese Cagno Rodero Solbiate C. le restanti in alto lago mentre i nuclei erano tutti a Cagno.

L'ingabbiamento delle regine è avvenuto subito dopo aver tolto i melari di castagno nell'olgiatese e dopo la raccolta sulla fioritura del tiglio in alto lago (15\30 LUGLIO).

Dove ho tolto il castagno non ho rimesso i melari non essendoci melata mentre, in alto lago, ad ogni famiglia è stato dato un melario perché era attiva una raccolta di melata, e così le famiglie non hanno intasato i nidi avendo appunto a disposizione i melari.

Alle famiglie senza melari ho provveduto a riempire il coprifavo (tipo alto) di trucioli questo per non esporre la regina una volta ingabbiata a temperature elevate essendo la gabbietta posizionata subito sotto la stecca porta favo .

Per ottimizzare il lavoro è necessario che si provveda per tempo al posizionamento della gabbietta e a marcare tutte le regine. La gabbietta che preferisco è la MOZZATO perché NON permette alla regina di deporre.

Per posizionare la gabbietta è consigliabile costruirsi una semplice fustella in acciaio leggermente più grande della stessa, così diventa facile ritagliare il favo sotto la stecca superiore, poi la gabbietta diventerà parte dell'alveare e non sarà più rimossa. Bisogna evitare di sostituire regine nel periodo prossimo all'ingabbiamento per non correre il rischio che una buona percentuale di queste vengano soppresse, direi che la stessa deve aver deposto più di un ciclo di covata, un mese può indicativamente essere sufficiente.



Io ho liberato le regine dopo 20\21 giorni e dopo 5\6 giorni sono passato ed ho verificato la deposizione ed eseguito il trattamento con acido oss. APIBIOXAL con 5cc per favo SEMPRE nel tardo pomeriggio.

Nelle famiglie divenute nel frattempo orfane, dopo aver effettuato il trattamento ho inserito una nuova regina avendo cura di non posizionarla dove vi erano tracce di sciroppo con APIBIOXAL. Per prudenza ho aggiunto anche un favo di covata fresca in caso di mancata accettazione della regina.

Dopo una settimana si effettua una visita veloce per verificare la deposizione ; se si trova eventualmente qualche nuovo caso di orfanità si dà un favo di covata fresca, dare una regina ad api così vecchie sarebbe inutile.

NON MI SEMBRA POI COSÌ COMPLICATO  
CIAO MARCO